

Cosa fare in caso di



IncIDENTE

STUDIODONTOIATRICO
ZINI&ASSOCIATI

Via Arturo Toscanini, 114
41122/ Modena
T 059 211131 / F 059 371775

DENTINI DA LATTE

Fino ai 5 anni nella bocca del tuo bambino ci sono solo "dentini da latte"

Dai 5 anni e mezzo iniziano a comparire i denti permanenti o definitivi



In caso di urto/ trauma ai dentini da latte:

1. **Tranquillizzare** il bambino



2. In caso di **sanguinamento delle labbra** tamponare con un telo bagnato con acqua fredda. Successivamente, applicare del ghiaccio (avvolto in un telo bagnato) nella zona per 5 minuti. Sospendere il ghiaccio per 20 minuti e riapplicare per altri 5 minuti.

In caso di **trauma alle labbra senza sanguinamento** applicare solo il ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona.



3. **Raccogliere il frammento del dentino o il dentino**, metterlo in un contenitore con un po' di saliva (del bimbo). In alternativa mettere il frammento/dentino in un contenitore con un po' di acqua o di latte.

4. **Andare col bimbo dal dentista appena possibile**, portando il frammento del dentino o il dentino.



DENTI PERMANENTI

Dai 5 anni e mezzo iniziano a comparire i denti permanenti o definitivi.

In caso di urto/ trauma ai denti definitivi:



Se è venuto via tutto il dente:

1. **Tranquillizzare** il bambino.

2. Se si è sicuri che si tratta di un dente definitivo, **lavare la zona** sanguinante e **il dente con acqua fredda** e **riposizionare** subito con due dita il **dente nell'alveolo** (zona in cui era il dente).

3. Applicando del ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona del trauma, **andare d'urgenza dal dentista** o (se lo studio è chiuso) al **pronto soccorso**.

OPPURE

2. Se non si è sicuri che si tratti di un dente definitivo, o non si riesce/ vuole riposizionare il dente nell'alveolo, **raccogliere il dente conservandolo in un contenitore con un po' di saliva** o di acqua o di latte.

3. Applicando del ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona del trauma, **andare d'urgenza dal dentista** o (se lo studio è chiuso) al **pronto soccorso**. È molto importante che il corretto riposizionamento del dente avvenga entro un'ora dal trauma.



Se si è rotto un pezzo di dente:

1. **Tranquillizzare** il bambino.

2. In caso di **sanguinamento delle labbra** tamponare con un telo bagnato con acqua fredda. Successivamente, applicare del ghiaccio (avvolto in un telo bagnato).

In caso di **trauma alle labbra senza sanguinamento** applicare solo il ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona.



3. **Raccogliere il frammento del dentino**. Metterlo in un contenitore con un po' di saliva del bimbo o acqua o latte.

4. **Andare col bimbo dal dentista appena possibile**, portando il frammento del dentino.