

cosa fare in caso di



inciDENTE

dentini da latte



Fino ai 5 anni nella bocca del tuo bambino ci sono solo "dentini da latte"

Dai 5 anni e mezzo iniziano a comparire i denti permanenti o definitivi

In caso di urto/trauma ai dentini da latte

- **Tranquillizzare il bambino.**
- **In caso di sanguinamento delle labbra,** tamponare con un telo bagnato con acqua fredda. Successivamente applicare del ghiaccio (avvolto in un telo bagnato) nella zona per 5 minuti. Sospendere il ghiaccio per 20 minuti e riapplicare per altri 5 minuti. **In caso di trauma alle labbra senza sanguinamento,** applicare solo il ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona.
- **Raccogliere il frammento del dentino o il dente,** metterlo in un contenitore con un po' di saliva (del bimbo). In alternativa, metterlo in un contenitore con un po' di acqua o di latte.
- **Andare col bimbo dal dentista** appena possibile, portando il frammento del dentino o il dente.



dentini permanenti

Dai 5 anni e mezzo iniziano a comparire i denti permanenti o definitivi.

In caso di urto/trauma ai denti definitivi

Se è venuto via tutto il dente:

- **Tranquillizzare il bambino.**
- **Se si è sicuri che si tratta di un dente definitivo,** lavare la zona sanguinante e il dente con acqua fredda e riposizionare subito con due dita il dente nell'alveolo (zona in cui era il dente).



OPPURE

- **Se non si è sicuri che si tratti di un dente definitivo,** o non si riesce/vuole riposizionare il dente nell'alveolo, **raccogliere il dente** conservandolo in un contenitore con un po' di saliva o acqua o latte.
- Applicando del ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona del trauma, **andare d'urgenza dal dentista** o (se lo studio è chiuso) al pronto soccorso. È molto importante che il corretto riposizionamento del dente avvenga entro 1' ora dal trauma.

Se si è rotto un pezzo di dente:

- **Tranquillizzare il bambino.**
- **In caso di sanguinamento** delle labbra tamponare con un telo bagnato con acqua fredda. Poi, applicare del ghiaccio (avvolto in un telo bagnato).
- **In caso di trauma alle labbra** senza sanguinamento applicare solo il ghiaccio (avvolto in un telo) nella zona.
- **Raccogliere il frammento del dentino.** Metterlo in un contenitore con un po' di saliva del bimbo o acqua o latte.
- **Andare col bimbo dal dentista** appena possibile, portando il frammento.

